

קרא /י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

## אקמול פוקוס קפליית

### הרכב

כל קפליה מכילה:

Acetylsalicylic acid	250 mg
Paracetamol	250 mg
Caffeine anhydrous	65 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Microcrystalline cellulose, stearic acid, crospovidone, silicon dioxide, hydroxypropyl methylcellulose, FD&C red #40, FD&C yellow #6, polyethylene glycol 400, titanium dioxide, polysorbate 80, purified water.

### פעילות רפואית

משכך כאבים במצבים כגון: מיגרנה, כאב ראש, דלקת בסינוסים, הצטננות, כאב שרירים, כאבי וסת, כאבי שיניים, כאבים שיגרוניים קלים וכאבים המלווים בחום.

### מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או מניקה. אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה או לתכשירים אחרים אנטידלקטיים אשר אינם סטרואידים. אין להשתמש בתרופה אם הינך סובל/ת מכיב קיבה מדמם, דימומים, המופיליה, בעיות בקיבה (כיב פפטי פעיל) או מאסטמה משולבת עם פוליפיס באף. אין להשתמש בתרופה בילדים ומתבגרים עד גיל 20 במחלות המלוות בחום דוגמת: שפעת או אבעבועות רוח (מתוך חשש לתיסמונת ריי). אין להשתמש בתכשיר אם לאחר נטילת משכך כאבים או תרופה להורדת חום סבלת אי פעם מהתופעות הבאות: אורטיקריה (פריחה בצקתית), נפיחות של הפנים, אסטמה, הלם.
---

**אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול** אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד מערכת הנשימה (כגון אסטמה), פוליפיס באף, הלב ו/או כלי דם, הכבד, הכליה, מערכת העיכול (כגון אולקוס), מערכת הדם (כגון קרישה וכ"ו), שגדון, אם הינך סובל/ת מהתמכרות לאלכוהול.

### איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.

### אזהרות

פרצטאמול עלול לגרום לנזק בכבד במקרים האלה: כאשר ניתן במינון גבוה מהמומלץ, ניתן לתקופה ממושכת, שותים משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול, כשנטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.  
אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח- למניעת מינון יתר/הרעלה של פרצטאמול.  
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.  
אם הינך רגיש/ה למוזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.  
התכשיר עלול להפריע לתוצאות של בדיקת סוכר בדם.  
אין ליטול תרופה זו 7 ימים לפני כל ניתוח.  
אין להשתמש בתרופה במתבגרים ובילדים מתחת לגיל 12 ללא התייעצות עם רופא.  
אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים ללא התייעצות עם רופא.

### תגובות בין-תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים  
או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות במיוחד, לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נגד קרישת דם, פרובנצייד (לשגדון), תרופות אשר מזרזות פעילות אנזימי כבד כגון: ברביטורטים או פניטואין (לעזימות), מטוטרקסט, תרופות נגד סכרת, זידובודין (לאיידס), תרופות נוספות בעלות פעולה משככת כאבים ונוגדי דלקות, תרופות המשפיעות על חומציות השתן.

**תופעות לוואי**

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: בחילה, גירוי בקיבה, כאב בטן, צרבת, כאב בטן קל.

**תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת**

תגובה אלרגית/ פריחה, גירוד בעור, אודם, נפיחות, קוצר או קשיי נשימה, צואה דמית או שחורה, עייפות או חולשה מוגברת, כאבים עזים בקיבה- הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.  
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

**מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא**

למבוגרים ולילדים מעל גיל 12 שנים: 2 קפלויות כל 6 שעות  
אין ליטול יותר מ- 8 קפלויות ב- 24 שעות  
אין ליטול התרופה מעבר ל- 48 שעות למיגרנה  
אין לעבור על המנה המומלצת.  
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל למתבגרים ולילדים מתחת לגיל 12 שנים  
אם החום נמשך למעלה מ-3 ימים או אם לא היתה הקלה בכאבים תוך 5 ימים יש לפנות לרופא.

**אופן השימוש**

אין ללעוס! לבלוע התרופה עם כוס מים מלאה.  
יש ליטול התרופה אחרי ארוחה.  
אין לשכב 15-30 דקות לאחר נטילת התרופה.  
אין לחצות או לכתוש את התרופה.

**מנע/י הרעלה!**

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.  
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.  
אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!  
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

**החסנה**

לשמור תרופה זו במקום קריר ויבש.  
גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.  
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**מס' רישום התרופה: 131 35 30995 00**

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,  
ת"ד 3190, פתח תקוה